

Wartość odżywcza	100 g	100 ml (13.5 % stężenie)
Wartość energetyczna	2085 kJ	279 kJ
	493 kcal	67 kcal
Tłuszcz (47 En%)	25.6 g	3.5 g
w tym		
- Kwasy nasycone	10.1 g	1.4 g
- Jednonienasycone	11.4 g	1.5 g
- Wielonienasycone	4.1 g	0.56 g
w tym		
-- Kwas linolowy	3.33 g	450 mg
-- Kwas α-linolenowy	0.33 g	44.5 mg
-- Kwas arachidonowy	0.13 g	17.0 mg
--Kwas dokozahexaenowy	0.12 g	16.7 mg
Węglowodany (42 En%)	52.1 g	7.1 g
w tym		
- Cukry	4.6 g	0.62 g
Błonnik (0 En%)	0 g	0 g
Równoważnik białka (11 En%)	13.3 g	1.8 g
Sól	0.53 g	0.07 g
Witaminy		
Witamina A	431 µg	58.2 µg
Witamina D	11.8 µg	1.59 µg
Witamina E (9.85 mg α-TE) 11.0 mg	(1.33 mg α-TE)	1.49 mg
Witamina C	52.7 mg	7.11 mg
Witamina K	44.7 µg	6.03 µg
Tiamina	0.59 mg	0.08 mg
Ryboflawina	0.59 mg	0.08 mg
Niacyna (9.41 mg NE) 4.09 mg	(1.27 mg NE)	0.55 mg
Witamina B6	0.48 mg	0.06 mg
Kwas foliowy	68.5 µg	9.24 µg

Składniki: suchy syrop glukozowy, rafinowane oleje roślinne (olej słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego, olej kokosowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy), L-asparaginy L-argininy, L-leucyna, octan L-lizyny, L-glutamina, L-prolina, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym), L-walina, L-izoleucyna, glicyna, wodorofosforan dipotasu, L-treonina, L-fenylalanina, L-tyrozyna, L-seryna, L-histydyna, L-alanina, wodorofosforan wapnia, cytrynian potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, L-cystyna, diwinyli cholin, glicerofosforan wapnia, L-tryptofan, cytrynian wapnia, chlorek magnezu, L-metionina, fosforan wapnia, olej z *Mortierella alpina*, olej z mikroalg *Schizochytrium sp.*, L-asparaginy magnezu, inozytol, kwas L-askorbinowy, przeciwutleniacze (lecytyny (lecytyna słonecznikowa) i palmitynian L-askorbylu), tauryna, siarczan żelaza(II), siarczan cynku, L-karnityna, octan DL-alfa-tokoferolu, sól sodowa 5'-monofosforanu urydyny, 5'-monofosforan cytydyny, nikotynamid,

Wartość odżywcza	100 g	100 ml (13.5 % stężenie)
Foliany	116 µg	15.7 µg
Witamina B12	138 µg	0.19 µg
Biotyna	19.2 µg	2.59 µg
Kwas pantotenowy	3.05 mg	0.41 mg
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe		
Sód	212 mg	28.6 mg
Potas	536 mg	72.4 mg
Chlorek	386 mg	52.1 mg
Wapń	580 mg	78.3 mg
Fosfor	370 mg	49.9 mg
Magnez	52.0 mg	7.02 mg
Żelazo	7.39 mg	1.00 mg
Miedź	0.42 mg	0.057 mg
Cynk	5.42 mg	0.73 mg
Mangan	0.049 mg	0.007 mg
Fluorek	≤ 44.4 µg	≤ 5.99 µg
Jod	103 µg	14.0 µg
Molibden	11.3 µg	1.53 µg
Selen	18.7 µg	2.53 µg
Chrom	10.8 µg	1.46 µg
Inne		
L-karnityna	10.8 mg	1.46 mg
Cholina	137 mg	18.5 mg
Inozytol	110 mg	14.9 mg
Tauryna	32.0 mg	4.32 mg
Nukleotydy	17.2 mg	2.33 mg
Osmolarność		310 mOsmol/l
Osmolalność		340 mOsmol/kg H ₂ O

D-pantotenian wapnia, sól sodowa 5'-monofosforanu inozyny, 5'-monofosforan adenozy, sól sodowa 5'-monofosforanu guanozy, siarczan miedzi(II), monoazotan tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, octan retinylu, jodek potasu, siarczan manganu, kwas pteroiomonoglutaminowy, fitomenadion, selenian(IV) sodu, chlorek chromu(III), molibdenian(VI) sodu, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Wyprodukowano przez: SHS International Ltd., Liverpool, Wielka Brytania.
Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Serwis Konsumentki: tel.: 22 55 00 155, e-mail: serwis@nutricia-medyczna.pl, www.alergianamlekokrowie.pl

NUTRICIA Neocate[®] LCP

Hipoalergiczny
Oparty na aminokwasach produkt dla niemowląt. Proszek

Do postępowania dietetycznego u niemowląt w **alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna**

0-12
MIESIĘCY

45 LAT
BADAŃ NAD ALERGIĄ

400 g e

ŻYWNOSĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO

PRODUKT KOMPLETNY POD WZGLĘDEM ODŻYWCZYM

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego u niemowląt w **alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna**

Ważne informacje: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Stosować pod nadzorem lekarza, po rozważeniu wszystkich możliwych sposobów żywienia, w tym karmienia piersią. Produkt odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia dla niemowląt od urodzenia do ukończenia 1 roku życia.

Informacje podane w tabeli są jedynie wskazówką:

Wiek niemowlęcia	Przybliżona masa ciała	Ilość płaskich miarek proszku	Objętość przegotowanej, ostudzonej wody	Ilość posiłków na dobę
po urodzeniu	3.5 kg	3	90 ml	6-7
2 tygodnie	4 kg	4	120 ml	6
2 miesiące	5.5 kg	5	150 ml	5-6
3 miesiące	6 kg	6	180 ml	5
5 miesięcy	7.5 kg	7	210 ml	4-5
7 miesięcy	8.5 kg	7	210 ml	4
10 miesięcy	9 kg	8	240 ml	4

Proponowane stosowanie: Ilość produktu do spożycia i rozcieńczenie muszą być określone wyłącznie przez lekarza i zależą od wieku, masy ciała oraz stanu klinicznego pacjenta. 1 płaska miarka = 4,5 g proszku.

Zalecane stężenie posiłku (13.5 % w/v) uzyskuje się dodając jedną płaską miarkę proszku do 30 ml wody. Osmolalność takiego roztworu (tj. 13,5 g proszku w 100 ml roztworu) wynosi 340 mOsmol/kg H₂O.

Ostrzeżenia dotyczące higieny zębów: Ważna jest higiena jamy ustnej niemowlęcia, gdyż przedłużający się lub zbyt częsty kontakt napojów lub pokarmów z zębami zwiększa ryzyko próchnicy. Należy umyć zęby niemowlęcia po ostatnim wieczornym karmieniu.

Niemowlę może wymagać większych lub mniejszych ilości produktu niż podane w tabeli. Jeśli do diety niemowlęcia jest wprowadzane inne pożywienie, to powinno się to odbywać wyłącznie pod nadzorem lekarza i ilość podawanego produktu może wymagać odpowiedniego zmniejszenia.

Przygotowanie: 1. Dokładnie umyć ręce i powierzchnię, na której będzie przygotowywany posiłek. Wysterylizować butelkę i smoczek lub wygotować w wodzie pitnej przez 10 minut. 2. Gotować świeżą wodę pitną przez 5 minut i pozostawić do wystygnięcia na co najmniej 30 minut. Woda powinna być ciepła po sprawdzeniu na wewnętrznej stronie przegubu dłoni. Wlać wymaganą ilość wody do wysterylizowanej butelki. 3. Napęścić proszkiem miarkę załączoną do opakowania. Nadmiar proszku usunąć czystym, suchym nożem. Nie ubijać proszku w miarę. Używać wyłącznie miarki załączonej do opakowania. 4. Dodać zaleconą ilość miarek proszku do wody. Zamknąć butelkę i wstrząsać, aż proszek się rozpuści. Przed podaniem upewnić się, że pokarm ma właściwą temperaturę poprzez umieszczenie kilku kropli na wewnętrznej stronie przegubu dłoni. 5. Produkt pozostały w butelce po karmieniu wyrzucić po jednej godzinie od przygotowania. Nie podgrzewać posiłku podczas karmienia.



Przygotowanie: **ZDROWIE NIEMOWLĘCIA ZALEŻY OD ŚCISŁEGO PRZESTRZEGANIA ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH SPOSOBU PRZYGOTOWANIA, STOSOWANIA I PRZECHOWYWANIA PRODUKTU. NIEWŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE I PRZECHOWYWANIE POSILKU MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA NIEMOWLĘCIA.**

Ważne: Produkt w proszku nie jest sterylny. Każdy posiłek należy przygotować bezpośrednio przed karmieniem. Nie gotować przygotowanego posiłku. Nie używać kuchenki mikrofalowej do przygotowania lub podgrzania posiłku.

Najlepiej spożyć przed: na dnie puszki. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po każdorazowym użyciu dokładnie zamknąć puszkę wieczkiem. Zużyć w ciągu jednego miesiąca od pierwszego otwarcia puszki. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.



2D

MAT. NUMBER

EAN 100%
(Min 85%)