

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

Wartość energetyczna	2023	276	100 g proszku produktu	100 ml	100 g proszku produktu	100 ml
Tłuszcz , w tym:	483	66	kcal			
- kwasy nasycone	25	3,4	g			
- kwasy jednonienasycone	11	1,6	g			
- kwasy wielonienasycone	9,1	1,2	g			
-- kwas linolowy (LA)	4,2	0,6	g			
-- kwas	3300	448	mg			
α-linolenowy (ALA)	400	54,3	mg			
-- kwas						
arachidonowy (AA)	120	16,5	mg			
-- kwas						
dokozahexaenowy (DHA)	120	16,5	mg			
-- kwas						
eikozapentaenowy (EPA)	30	3,6	mg			
Węglowodany , w tym:	52	7,1	g			
- cukry	26	3,5	g			
-- laktoza	21	2,89	g			
Błonnik , w tym:	4,0	0,5	g			
- oligosacharydy GOS*	3,4	0,47	g			
- oligosacharydy FOS**	0,58	0,08	g			
Białko***	12	1,6	g			
- L-kamityna	15	2,1	mg			
Sól	0,38	0,05	g			
Witaminy						
Witamina A	426	58	µg			
Witamina D	12	1,7	µg			
Witamina E	10	1,4	mg			
Witamina K	33	4,4	µg			
Witamina C	67	9,1	mg			
Tiamina	0,49	0,07	mg			
Ryboflawina	1,0	0,14	mg			
Niacyna	6,4	0,88	mg			
Witamina B6	0,33	0,05	mg			
Kwas foliowy	64	8,8	µg			
Witamina B12	1,2	0,16	µg			
Biotyna	14	1,9	µg			
Kwas pantotowy	4,2	0,57	mg			

posiłku. Należy zwrócić uwagę na higienę pierwszych zębów, szczególnie przed snem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami produktu. Nigdy nie dodawać dodatkowych miarek proszku bądź niczego innego do przygotowywanego produktu.

Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. **Bebilon® pepti 1 SYNEO™** zawiera *Bifidobacterium breve* M-16V i nie jest wskazany dla noworodków przedwcześnie urodzonych i niemowląt z niedoborami odporności.

SKŁADNIKI

hydrolyzaty białka serwatkowego z mleka, maltodekstryna, oleje roślinne w zmiennych proporcjach (palmowy z certyfikowanych upraw, kokosowy, rzepakowy, wysoko-oleinowy słonecznikowy, słonecznikowy), galaktooligosacharydy z mleka (8,91 %), wapiń, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym, lecytyny), fruktooligosacharydy (0,61 %), olej rybi, potas, olej z *Mortierella alpina*, chlorek cholina, sód, magnez, L-tyrozyna, witamina C, inozytol, tauryna, *Bifidobacterium breve* M-16V, żelazo, cynk, L-kamityna, witamina E, nukleotydy (sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, kwas cytrydino-5'-monofosforowy, sól sodowa kwasu inozydno-5'-fosforowego, kwas adenydno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu guanidyno-5'-fosforowego), kwas pantotenowy, przeciwdrożdżak (palmitynylin L-askorbylu), niacyna, miedź, witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina B6, mangan, jod, kwas foliowy, selen, witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12.

* Galaktooligosacharydy
** Fruktooligosacharydy
*** Białko serwatkowe mleka krowiego poddane hydrolizie znacznego stopnia

WAŻNE INFORMACJE

Stosować pod nadzorem lekarza, po rozważeniu wszystkich możliwych sposobów żywienia, w tym karmienia piersią. Odpowiedni dla niemowląt od urodzenia do ukończenia 6. miesiąca życia. Produkt może stanowić jedyne źródło pożywienia niemowląt od urodzenia. Produkt powinien być przygotowany zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystany w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie używać ponownie nie wykorzystanej części produktu. Niewykorzystaną porcję produktu należy wywalić bezpośrednio po skończonym



SYNEO™

Do postępowania dietetycznego w przypadku ALERGII NA BIAŁKA MLEKA KROWIEGO
Hipoalergiczna formuła

BIĄŁKO SERWATKOWE O ZNAČNYM STOPNIU HYDROLIZY
Bifidobacterium breve i kompozycja oligosacharydów (GOS/FOS)
Formuła kompletna odżywczo

1 OD URODZENIA
ŻYWNÓŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO

45 lat badań nad alergią

400 g e

TABELA ŻYWIENIA

O ile lekarz nie zaleci inaczej
Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka.

Wiek niemowlęcia	Liczba porcji na dobę	Woda (ml) na 1 porcję	Liczba płaskich miarek na 1 porcję
0-2 tygodnie	6	90	3
2-4 tygodnie	5-6	120	4
4-8 tygodni	5	150	5
8-16 tygodni	4-5	180	6
4-6 miesięcy	4	210	7

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody + 3 płaskie miarki produktu = 276 kJ (66 kcal). 1 płaska miarka = 4,6 g proszku

Przygotowanie: 1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania produktu. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut. 2. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut, pozostaw do schłodzenia (do ok. 40 °C). Sprawdź tabelę żywienia. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki. 3. Nie gotuj ani nie podgrzewaj produktu w kuchenke mikrofalowej, by uniknąć zagrożenia oparzeniem i aby utrzymać odpowiednią ilość bakterii *Bifidobacterium breve*. 4. Używaj wyłącznie załączonej miarki. Odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych miarek produktu **Bebilon® pepti 1 SYNEO™**. 5. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek. 6. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

Najlepiej spożyć przed: na dzień puszk.

PRZECHOWYWANIE

◆ Produkt w puszcze zamkniętej fabrycznie jak i po jej otwarciu należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25 °C ◆ Nie przechowywać w lodówce ◆ Chronić od wilgoci ◆ Po otwarciu przechowywać puszkę szczelnie zamkniętą ◆ Zużyć nie później niż 4 tygodnie po pierwszym otwarciu puszki ◆ Nie zaleca się przesypania produktu do innych pojemników ◆ Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Produkt w proszku.
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa



400 g e

NASZA UNIKALNA EKSPERTYZA


45 lat badań firmy Nutricia w żywieniu w pierwszych latach życia zainspirowało nasz zespół naukowców i ekspertów do stworzenia preparatu **Bebilon® pepti 1 SYNEO™**. Preparat jest dostosowany do potrzeb żywieniowych niemowląt, u których rozpoznano alergię na białka mleka krowiego. Jeśli podejrzewasz alergię na białka mleka krowiego u swojego dziecka, skonsultuj z lekarzem użycie produktu.

45 lat badań nad alergią

Bebilon. PEPTI 1 SYNEO™

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego:

- w alergii na białka mleka krowiego
- w objawach związanych z alergią na białka mleka krowiego tj: objawy skórne (AZS, pokrzywka), zaburzenia żołądkowo-jelitowe (kolka, zaburzenia konsystencji stolca), objawy ze strony układu oddechowego (objawy astmopodobne).



Produkt może być stosowany w diecie eliminacyjnej, w diagnostyce alergii na białka mleka krowiego. **Bebilon® pepti 1 SYNEO™** jest hydrolyzatem o znacznym stopniu hydrolizy, w którym białka mleka zostały rozłożone, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wywołania reakcji alergicznej. Jeżeli po 2-4 tygodniach stosowania **Bebilon® pepti 1 SYNEO™** objawy w pełni nie ustąpiły, skonsultuj z lekarzem włączenie preparatu opartego na aminokwasach.

NASI EKSPERCI SĄ DLA CIEBIE

Chcesz porozmawiać o żywieniu dziecka? Zadzwoń: **801 16 55 55** (opłata zgodna z cennikiem operatora) lub wejdź na www.alergiamlekakrowie.pl

KOLEJNY KROK

Po 6. miesiącu życia dziecka skonsultuj z lekarzem kontynuację żywienia produktem z linii **Bebilon® pepti SYNEO™**.

