

Wartość energetyczna	100 g	100 ml	Kl	Składniki mineralne	100 g	100 ml	
	proszku	produktu			proszku	produktu	
1972	285						
471	68	kcal	Sód	153	22,1	mg	
Tłuszcz , w tym:	22	3,2	g	Potas	621	90	mg
-- kwasy nasycone	10	1,5	g	Chlorek	364	53	mg
-- kwasy jednonienasycone	8,2	1,2	g	Wapń	546	79	mg
-- kwasy wielonienasycone	3,8	0,5	g	Fosfor	343	49	mg
-- kwas linolowy (LA)	3000	429	mg	Magnez	52	7,6	mg
-- kwas				Żelazo	7,1	1,0	mg
α-linolenowy (ALA)	360	51,9	mg	Cynk	4,7	0,68	mg
-- kwas				Miedź	0,37	0,053	mg
arachidonowy (AA)	120	17,1	mg	Mangan	0,046	0,007	mg
-- kwas				Fluorek	≤0,042	≤0,006	mg
dokozahexaenowy (DHA)	120	17,1	mg	Selen	22	3,1	µg
-- kwas				Chrom	≤42	≤6,1	µg
eikozapentaenowy (EPA)	30	3,7	mg	Molibden	≤42	≤6,1	µg
Jod				Jod	90	13	µg
Węglowodany , w tym:	54	7,8	g	Inne			
-- cukry	25	3,6	g	Tauryna	35	5,1	mg
-- laktoza	21	3,0	g	Cholina	103	15	mg
Błonnik , w tym:	3,9	0,6	g	Nukleotydy	17	2,4	mg
-- oligosacharydy GOS*	3,3	0,48	g	Pozostałe GOS*	1,6	0,2	g
-- oligosacharydy FOS**	0,56	0,08	g	Osmolalność		260 mOsmol	
Białko***	11	1,6	g	* Galaktooligosacharydy			
-- L-kametyna	14	2,0	mg	** Fruktooligosacharydy			
Sól	0,38	0,06	g	*** Białko serwatkowe mleka krowiego			
Witaminy				poddane hydrolizie znacznego stopnia			
Witamina A	416	60	µg	WAŻNE INFORMACJE			
Witamina D	12	1,7	µg	Stosować pod nadzorem lekarza, po rozważeniu			
Witamina E	95	1,4	µg	w wszystkich możliwych sposobach żywienia			
Witamina K	31	4,5	µg	w tym kamienia piersi. Produkt jest odpowiedni			
Witamina C	59	8,5	mg	wyłącznie dla niemowląt powyżej 6. miesiąca			
Tiamina	0,45	0,07	mg	życia, dzieci i dorosłych. Produkt nie jest			
Ryboflawina	0,99	0,14	mg	odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia			
Niacyna	6,4	0,92	mg	niemowlęcia powyżej 6. miesiąca życia i powinien			
Witamina B6	0,31	0,044	mg	stanowiąc tylko część zróżnicowanej diety. Produkt			
Kwas folowy	59	8,5	µg	powinien być przygotowany zawsze			
Witamina B12	13	0,16	µg	bezośrednio przed spożyciem i wykorzystaniem			
Biotyna	13	1,8	µg	w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie			
Kwas pantotenowy	3,86	0,56	mg	należy używać ponownie niewykorzystanej części			

Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. **Bebilon® pepti 2 Syneo™** zawiera *Bifidobacterium breve* M-16V i nie jest wskazany dla niemowląt z niedoborami odporności.

matłodekstryna, hydrolizat białka serwatki z **mleka**, oleje roślinne w zmieniach proporcji (palmowy z certyfikowanych upraw, kokosowy), zapewkowy, wysokoolejowy słonecznikowy, słonecznikowy, galaktooligosacharydy z **mleka** (8,68%), wapni, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym, lecytyny), fruktooligosacharydy (0,60%), olej rybi, potas, magnez, olej z *Mortierella alpina*, sól, cholesterol, cholina, L-tyrozyna, witamina C, inozytol, tauryna, lecytyn, *Bifidobacterium* Brev-M-163, cynk, L-karnityna, witamina E, nukleotydy (sól sodowa kwasu 5'-morfolino-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu 2',5'-morfolino-5'-fosforowego, sól sodowa

Stosować pod nadzorem lekarza, po rozważeniu wszystkich możliwych sposobów żywienia w tym kamienia piersi. Produkt jest odpowiedni wyłącznie dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, dzieci i dorosłych. Produkt nie jest odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia niemowlęcia powyżej 6. miesiąca życia i powinien stanowić tylko część zbilansowanej diety. Produkt powinien być przygotowany zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystany w ciągu **2 godzin** po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części produktu. Niewykorzystaną porcję produktu

Bebilon®
PEPTI

45
— lat —
badań
nad alergią

SYNEO™

ALERGII NA BIAŁKA MLEKA KROWIEGO

BIĄŁKO SERWATKOWE O ZNACZNYM STOPNIU HYDROLIZY

Bifidobacterium breve
i kompozycja
oligosacharydów
(GOS/FOS)

2 DLA NIEMOWLĄT POWYŻEJ 6. MIESIĄCA ŻYCIA, DZIECI I DOROSŁYCH

400 g e

0 ile lekarz nie zaleci inaczej

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka.

Wiek dziecka	Liczba porcji na dobę	Woda (ml) na 1 porcję	Liczba płaskich miarek na 1 porcję	Średnia objętość porcji (ml)
6-12 miesięcy	2-3	210	7	230
powyżej 1. roku życia	2	210	7	230
powyżej 2. roku życia	2	210	7	230

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody
+ 3 płaskie miarki produktu = 285 kJ (68 kcal). 1 płaska miarka = 4,8 g proszku

Przygotowanie: 1. Wyrzucić i wyparzyć naczynia potrzebne do przygotowania produktu. Wytępić butelkę i smoczek lub kubek w wodzie przez 10 minut. 2. Gotuj świeżą wodę przez 5 minut, pozostaw do schłodzenia (do ok. 40 °C). Sprawdź tabelę wywienia. Wlej dokładną ilość uprzednio przygotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki lub kubka. 3. Nie gotuj ani nie podgrzewaj produktu w kuchence mikrofalowej, by uniknąć zagrożenia oparzeniem i aby utrzymać odpowiednią ilość bakterii *Bifidobacterium breve*. 4. Używaj wyłącznie zalecanej miarki. Odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych miarek produktu **Bebilon®** **pepli 2 SYNEO™**. 5. Zamknij butelkę lub kubek i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek. 6. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umij butelkę i smoczek lub kubek zaraz po użyciu.

Najlepiej spożyć przed: na dnie puszki.

◆ Produkt w puszcze zamkniętej fabrycznie jak i po jej otwarciu należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25 °C ◆ Nie przechowywać w lodówce. Chronić od wilgoci ◆ Po otwarciu przechowywać puszkę szczelnie zamkniętą ◆ Zużyć nie później niż **4 tygodnie** po pierwszym otwarciu puszki ◆ Nie zaleca się przysypywania produktu do innych pojemników ◆ Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Produkt w proszku.

Nutricia Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

PL
16616001
UF

400 g e

NASZA UNIKALNA EKSPERTYZA

45 lat badań firmy Nutricia w żywieniu w pierwszych latach życia zainspirowało nasz zespół naukowców i ekspertów do stworzenia preparatu **Bebilon® pepti 2 SYNEO™**. Preparat jest dostosowany do potrzeb żywieniowych niemowląt i dzieci, u których rozpoznano alergię na białka mleka krowiego.

Jeśli podejrzewasz alergię na białka mleka krowiego u swojego dziecka, skonsultuj z lekarzem użycie produktu.

45
— lat —
badañ na
alergia

Bebilon.
PEPTI 2 SYNEO™

Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego do postępowania dietetycznego:

- w alergii na białka mleka krowiego
- w objawach związanych z alergią na białka mleka krowiego tj:
objawy skórne (AZS, pokrzywka),
zaburzenia żołądkowo-jelitowe (kolka, zaburzenia konsystencji stolca),
objawy ze strony układu oddechowego (objawy astmopodobne).

Produkt może być stosowany w diecie eliminacyjnej, w diagnostyce w alergii na białka mleka krowiego. **Bebilon® pepti 2 SYNEO™** jest hydrolizatem o znacznym stopniu hydrolizy białka, w którym białka mleka zostały rozłożone, aby zmniejszyć ryzyko wywołania reakcji alergicznej.

Bebilon® pepti 2 SYNEO™ może być stosowany bez górnej granicy wiekowej. Produkt może stanowić bazę do przygotowania kasełek bezmlecznych i innych produktów niewymagających obróbki termicznej.

Jeżeli po 2-4 tygodniach stosowania **Bebilon® pepti 2 SYNEO™** objawy w pełni nie ustąpiły, skonsultuj z lekarzem włączenie preparatu opartego na aminokwasach.

**KAŻDY KROK MA
ZNACZENIE**

Nasze opakowanie nadaje się do recyklingu, 100 % energii elektrycznej w naszej fabryce pochodzi ze źródeł odnawialnych, a to tylko początek.

**Wspólnie zadbajmy
o środowisko.**

**NASI EKSPERCI
SĄ DLA CIEBIE**
Chcesz porozmawiać o żywieniu dziecka?
Zadzwoń: **801165555**
(opłata zgodna z cennikiem operatora)
lub wejdź na **www.alergianamlekokrow**

