

Wartość odżywcza	100 g proszku:	100 ml*
Wartość energetyczna	1992 kJ	420 kJ
	475 kcal	100 kcal
Tłuszcz (42 En%)	22,0 g	4,6 g
w tym		
- Kwasy nasycone	9,4 g	2,0 g
- Jednonienasycone	7,7 g	1,6 g
- Wielonienasycone	4,0 g	0,84 g
Węglowodany (47 En%)	56,0 g	11,8 g
w tym		
- Cukry	5,0 g	1,1 g
Błonnik (0 En%)	0 g	0 g
Równoważnik białka (11 En%)	13,3 g	2,8 g
Sól	0,71 g	0,15 g
Witaminy		
Witamina A	214 µg	45,2 µg
Witamina D	6,2 µg	1,3 µg
Witamina E	6,7 mg (α-ET)	1,4 mg (α-ET)
Witamina K	19,0 µg	4,0 µg
Tiamina	0,48 mg	0,10 mg
Ryboflawina	0,95 mg	0,20 mg
Niacyna	(9,0 mg EN) 5,3 mg	(1,9 mg EN) 1,1 mg
Kwas pantotenowy	1,9 mg	0,40 mg
Witamina B ₆	0,48 mg	0,10 mg
Kwas foliowy	71,3 µg	15,0 µg

*Zalecane stężenie wynosi 21,1 %

Składniki: suchy syrop glukozowy, rafinowane oleje roślinne (średniołańcuchowe triglicerydy (olej ziaren palmowych i/lub olej kokosowy), olej słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego, olej rzepakowy, olej słonecznikowy), L-seryna, L-glutamina, maltodekstryna, glicyna, L-alanina, L-leucyna, octan L-lizyny, L-treonina, cytrynian potasu, L-tyrozyna, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym), L-walina, L-izoleucyna, wodorofosforan wapnia, chlorek magnezu, L-prolina, wodorofosforan disodu, węgiel wapnia, L-cystyna, L-histydyna, L-fenylalanina, wodorofosforan dipotasu, L-metionina, L-arginina, chlorek sodu, diwinian cholin, L-tryptofan, cytrynian wapnia, kwas L-askorbinowy, chlorek wapnia, przeciwutleniacze (lecytyna (lecytyna słonecznikowa), palmitynian

Wartość odżywcza	100 g proszku:	100 ml*
Witamina B ₁₂	1,2 µg	0,25 µg
Biotyna	14,3 µg	3,0 µg
Witamina C	47,5 mg	10,0 mg
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe		
Sód	285 mg	60,1 mg
Potas	546 mg	115 mg
Chlorek	437 mg	92,2 mg
Wapń	428 mg	90,3 mg
Fosfor	309 mg	65,2 mg
Magnez	66,5 mg	14,0 mg
Żelazo	5,7 mg	1,2 mg
Cynk	5,2 mg	1,1 mg
Miedź	0,48 mg	0,10 mg
Mangan	0,29 mg	0,06 mg
Molibden	21,4 µg	4,5 µg
Selen	15,2 µg	3,2 µg
Chrom	7,6 µg	1,6 µg
Jod	71,3 µg	15,0 µg
Inne		
Cholina	95,0 mg	20,0 mg
Inozytol	26,1 mg	5,5 mg
L-karnityna	15,80 mg	3,3 mg
Tauryna	31,45 mg	6,6 mg
Osmolalność	600 mOsmol/kg H ₂ O	

L-askorbylu), tauryna, inozytol, siarczan żelaza(II), L-karnityna, siarczan cynku, octan DL-alfatokoferylu, nikotynamid, D-pantotenian wapnia, siarczan miedzi(II), ryboflawina, siarczan manganu, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, octan retinylu, jodek potasu, kwas pteroiomonoglutaminowy, molibdenian(VI) sodu, chlorek chromu(III), selenian(IV) sodu, fitomenadiol, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Wyprodukowano przez: SHS International Ltd., Liverpool, Wielka Brytania.

Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

Serwis Konsumentki: tel.: 22 55 00 155,

e-mail: serwis@nutriciamedyczna.pl

www.alergiamlekaokrowie.pl

45 LAT BADAŃ
NAD ALERGIĄ

NUTRICIA Neocate JUNIOR

Hipoalergiczny

Oparty na aminokwasach produkt dla dzieci. Proszek

Do postępowania dietetycznego u dzieci powyżej 1. roku życia w: **alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna**

1+

o smaku neutralnym

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Produkt kompletny pod względem odżywczym

400 g e

Neocate Junior o smaku neutralnym. Do postępowania dietetycznego u dzieci powyżej 1. roku życia w: alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna. **Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.**

Ważne informacje: Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Stosować pod nadzorem lekarza. Nie stosować u niemowląt poniżej 1. roku życia. Produkt odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia lub jako uzupełnienie diety.

Ilość miarek	Woda (ml)	Objętość całkowita w przybliżeniu (ml)
1 (7,3 g)	30	35
3 (21,9 g)	90	105
10 (73 g)	300	350

Proponowane stosowanie: Ilość produktu do spożycia i rozcieńczenie muszą być określone wyłącznie przez lekarza i zależą od wieku, masy ciała oraz stanu klinicznego pacjenta.

Zalecane stężenie posiłku: Zalecane stężenie 21,1 % w/v (1 kcal/ml) uzyskuje się dodając 1 płaską miarkę proszku na każde 30 ml wody. 1 płaska miarka = 7,3 g proszku.

Przygotowanie

- Umyć ręce. Używać czystych naczyń.
- Odmierzyć wymaganą objętość wody i wlać do naczynia. Napełnić proszkiem miarkę załączoną do opakowania. Nadmiar proszku usunąć czystym, suchym nożem. Nie ubijać proszku w miarce. Używać wyłącznie miarki załączonej do opakowania.

- Dodać zalecaną ilość miarek proszku do wody i zamieszać.
- Zamknąć naczynie i wstrząsać, aż proszek się rozpuści. Produkt przygotowany do spożycia przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin. Wstrząsnąć lub zamieszać bezpośrednio przed podaniem. Produkt stosowany doustnie najlepiej podawać schłodzony.



Ważne: Nie gotować przygotowanego posiłku. Nie używać kuchenki mikrofalowej do przygotowania lub podgrzania posiłku.

Najlepiej spożyć przed: data na dnie puszki.

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po każdorazowym użyciu dokładnie zamknąć puszkę wieczkiem. Zużyć proszek w ciągu jednego miesiąca od pierwszego otwarcia puszki. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Smak produktu jest ważny dla dziecka powyżej roku. Neocate Junior występuje również w innych wariantach smakowych – Neocate Junior o smaku truskawkowym oraz Neocate Junior o smaku waniliowym. Urozmaicona dieta dziecka jest ważna w okresie wzrastania. Neocate Junior może stanowić również bazę do przygotowywania kaszek bezmlecznych i innych posiłków.



10487674
128764

